

SPECIMEN LISTS AND TABLES

ABBREVIATIONS TO TABLES

Areas are shown in parentheses after KNM-ER numbers, followed by zones.

A	zone A
B	zone B
C	zone C
KF IIA	Koobi Fora IIA (see p. 7 and Fig. 1.4)
KF IIB	Koobi Fora IIB
KF III	Koobi Fora III
N.s	<i>Notochoerus scotti</i> zone
M.a	<i>Metridiochoerus andrewsi</i> zone
M.c	<i>Metridiochoerus compactus</i> zone
GB	Galana Boi Beds
GF	Guomde Formation
*	specimen measured at mid height
()	estimated measurement
ant	anterior
ap	anteroposterior length
diap ap	diaphysis minimum anteroposterior diameter
diap tr	diaphysis minimum width
dist	distal
dist ap	distal articular anteroposterior diameter
dist sup tr	distal supra-articular width
dist tr	distal articular width

ect	ectostylid occlusal length
ht	height of crown
int	internal
max	maximum
min	minimum
oc ap	occlusal length
oc tr	occlusal width
PI	protoconal index
plic	number of plications including caballine folds
post	posterior
prox ap	proximal anteroposterior articular diameter
prox tr	proximal articular width
ptc	protocone occlusal length
tr	maximum width

Teeth measurements are taken at the occlusal surface unless otherwise indicated.

Equid 3rd and 4th premolars and 1st and 2nd molars are often difficult to differentiate on isolated teeth, and measurements of the posterior premolars and anterior molars have been grouped together in the tables. Where two sets of measurements are listed under the same accession number, the first set is for P₃ (or M₁) and the second for P₄ (or M₂).

TABLE 5.2.
Hipparrison hasumense sp. nov. lower cheek teeth
 measurements (mm)

	KNM-ER No., area and zone	oc ap	oc tr	ect	ht
P_2	2768A (203 B)	27·5	14	2·5	37
	2788A (117 C)	33	14	—	38
P_{3-4}	2776** (204 B)	26	15	4	27
	2776** (204 B)	25·5	15	4	35
	2786A (117 C)	30	18	4·5	58
	2788C (117 C)	27	16	2·5	47
	2921 (117 B)	28·5	15	3·5	—
	4073 (117 C)	27	15	—	56
	4074 (117 B)	24	15	4	25
	4077 (129 B)	—	16	—	31
	4080 (129 B)	28	17	4	34
	4080 (129 B)	26·5	15	4	41
	4084 (129 B)	29	16·5	5	—
	4084 (129 B)	31	15	—	62
	4093 (116 B)	30	14	—	68
	2776** (204 B)	22	12	3	29
M_{1-2}	2776** (204 B)	22·5	11	1	31
	2788B (117 C)	24	12	4	50
	2788D (117 C)	26·5	11	—	55
	4080 (129 B)	25	14	2·5	30
	4084 (129 B)	27	15	5	50
	4084 (129 B)	27	14	5	52
	4092 (116 B?)	28	13·5	4	59
	2768B (203 B)	26·5	9·5	—	(47)
M_3	2787 (117 C)	27	11·5	4	43
	4084 (129 B)	(27)	9·5	—	56

** Holotype.

Hipparrison sp. A

KNM-ER No.	Area	Specimen
Zone C	2766	203
Guomde formation	1234	6A
Horizon indet.	335	Rt P_{3-4} , Rt M_{1-2} , Rt M_3
	673	KF III dP ₁ , Rt P_4 , Rt M_2

TABLE 5.3.
Hipparrison sp. A lower cheek teeth measurements
 (mm)

	KNM-ER No., area and zone	oc ap	oc tr	ect	ht
P_{3-4}	673A (KF III)	26·2	16	6	51
	1234 (6A GF)	23	15·5	5	30
	2766 (203 C)	(28·5)	17	5	45
M_{1-2}	673B (KF III)	24	10·3	—	60
	335B (7A?)	25·1	14	4·6	52

Hipparrison cornelianum

KNM-ER No.	Area	Specimen
<i>Notochoerus scotti</i> zone	3539	105 immature cranium

Hipparrison cf. ethiopicum

KNM-ER			
No.	Area	Specimen	
Zone B			
4095	116	Rt astragalus	
<i>Notochoerus scotti zone</i>			
1230	105	Rt maxilla frag (P ⁴ -M ¹)	
1626	105	Lt and Rt mandible	
1770	131	M _{1,2}	
2071	129	Rt M ³	
2072	130	Lt M ^{1,2}	
2751	14	Rt P _{3,4}	
2752	14	Rt M _{1,2}	
2753	14	Rt M ₃	
3990	102	Rt maxilla frag (P ²⁻³)	
4076	14	Lt P _{3,4}	
4079	105	Lt M ^{1,2}	
4082	105	Rt mandible frag (P ₂₋₃)	
4084	129	Rt P ₃ -M ₃	
4086	14	Lt P ^{3,4}	
4087	14	Lt M ₃	
4088	14	Lt M _{1,2}	
4089	129	Rt M ³	
4090	129	Rt M _{1,2}	
4091	129	I, Lt P ^{3,4} , Lt M ^{1,2}	
4094	116	Lt M ³	
5353	100	Lt M ³	
5354	100	Lt M _{1,2}	
5357	104	P _{3,4}	
<i>Metridiochoerus andrewsi zone</i>			
776	103	P ₂ -M ₃	
1232	8A	Lt M ³	
1235	8A	dist. 3rd metatarsal	
1236	104	Rt M _{1,2}	
1238	6A	dist. tibia	
1244	102	Rt M _{1,2}	
1264	10	Lt M _{1,2}	
1294	103	Rt M ₃	
1295	103	Rt astragalus	
1345	6A	dist. 3rd metatarsal	
1456	104	Lt mandible frags (I ₂ , P ₃₋₄ , M ₃)	
1981	12	Lt M _{1,2}	
2047	123	astragalus	
2053	103	prox. lateral metapodial	
2070	103	Lt M ^{1,2}	
2242	103	lateral metapodial frag	

Hipparrison cf. ethiopicum cont.

KNM-ER			
No.	Area	Specimen	
2264	104	Rt P _{3,4}	
2638	8B	Rt P _{3,4}	
3989	119	Rt M _{1,2}	
4005	103	Rt M ₃	
4053	101	Lt M _{1,2} and M frags	
5355	103	Rt astragalus	
5356	104	Lt astragalus	
<i>Metridiochoerus compactus zone</i>			
1278	103	Rt M ^{1,2}	
2069	103	M _{1,2} and associated postcranials	
2656	1A	Lt and Rt M ₃	
2668	11	P ²	
2690	8	Lt astragalus	
5715	103	M _{1,2}	
Guomde Formation	1234	6	Lt P _{3,4}

TABLE 5.4.
Hipparrison cf. ethiopicum and *H. cornelianum* upper
cheek teeth measurements (mm)

	KNM-ER No., area and zone	oc ap	oc tr	ptc	ht	plic
P ²	3990 (102 N.s)	30	21	7.5	(28)	13
	2668 (11 M.c)	32	22	8	47	13
P ³ +	1230 (105 N.s)	25	26.5	11	42	18
	4086 (14 N.s)	25	24	7	59	(11)
	4091 (129 N.s)	24	27	9	21	—
M ¹⁻²	1230 (105 N.s)	23	24	9	42	14
	2072 (130 N.s)	23	22	9	66	14
	†3539 (105 N.s)	(25.5)	(24)	9	—	—
	4079 (105 N.s)	23	22	9	63	(6)
	4091 (129 N.s)	23.5	23	8	30	(10)
	2070 (103 M.a)	22.5	22	—	57	10
	1278 (103 M.c)	24	23	9	50	18
M ³	2071 (129 N.s)	22.5	18	7	56	(8)
	4089 (129 N.s)	23.5	—	10	55	—
	4094 (116 N.s)	23*	21.5*	(9)	60	—
	1232 (8A M.a)	22	21	9.5	35	8
	4005 (103 M.a)	23	20	8	(40)	(10)

† *Hipparrison cornelianum*.

TABLE 5.5.
Hipparrison ethiopicum and *H. cf. ethiopicum* lower cheek teeth measurements (mm)

	KNM-ER No., area and zone	oc ap	oc tr	ect	ht
<i>P₂</i>	1626 (105 N.s)	28	15	6	—
	4082 (105 N.s)	29	16	4	—
	1626 (105 N.s)	24·5	16·5	8	—
	1626 (105 N.s)	23·5	14	6	(30)
	2751 (14 N.s)	26·5	14	2	61
	4076 (14 N.s)	24·5	15	6	45
	4082 (105 N.s)	25	17	6·5	—
	4084 (14 N.s)	24	15·5	6	26
	5357 (104 N.s)	23·5	—	—	64
	776 (103 M.a?)	28·5	13·5	3·5	40·5
<i>P_{3/4}</i>	776 (103 M.a?)	24·5	16	6·5	45
	1456 (104 M.a)	24	16·5	8·5	38
	1456 (104 M.a)	24	15	7	35
	2264 (104 M.a)	25	16	6	42
	2638 (8B M.a)	24·5	15	7	61
	1234 (6 GF)	23	15·5	5	30
	1951·4.128** (Omo)	23·5	16·5	7·2	—
<i>M_{1,2}</i>	1626 (105 N.s)	23	13·5	7	—
	1626 (105 N.s)	22	12·5	5	—
	1770 (131 N.s)	23·5	13·5	5·5	28
	2752 (14 N.s)	25	11·5	2	62
	4088 (14 N.s)	23	14	6	24
	4090 (129 N.s)	23·5	11·5	5·5	—
	1236 (104 M.a)	21	14	6·5	19
	1264 (10 M.a)	22	12	5	46
	1456 (104 M.a)	(25)	11	—	38
	1981 (12 M.a)	22·5	14	6	41
	6100 (101 M.a)	23	13	6	45
	5354 (100 M.a)	22	13·5	6	37
	5715 (103 M.c)	24	(11·5)	—	60
	776 (103 M.a?)	22·5	12·5	4·5	51
	776 (103 M.a?)	24	11	0·5	(56)
	1244 (102 M.a?)	24	(11)	2	—
	3989 (119 M.a)	(21·5)	14	6·5	29
	1951·4.129** (Omo)	23	15	6·2	41
	1951·4.131** (Omo)	23·5	14·7	7·5	44
<i>M₃</i>	1626 (105 N.s)	26	11	1	—
	2753 (14 N.s)	25*	10	2	54
	4087 (14 N.s)	(23)	9	—	57
	1294 (103 M.a)	25·5	—	—	—
	1456 (104 M.a)	(26)	11	—	40
	5353 (100 M.a)	27	11	4·5	—
	776 (103 M.a?)	(24)	—	—	—
	2656 (1A M.c)	25	11	1·5	56
	1951·4.127**	27	12·7	5	42

** *Hipparrison ethiopicum* lectotype and associated teeth, Omo, level unknown.

Hipparrison sp. B

	KNM-ER No.	Area	Specimen
<i>Notochoerus scotti</i> zone	1268	130	Rt P _{3,4}
	3985	129	Lt M ³
	4096	130(?)	P _{3,4}
<i>Metridiochoerus andrewsi</i> zone	1231	8A	Rt M ^{1,2}
	1263	10	Rt M ³
	2073	131	Rt M ^{1,2}
	2263	104	Rt M ^{1,2}
	2667	8B	Lt P _{3,4}
	3988	102	Lt P _{3,4}
	4054	101	Lt P ₂ , Lt P _{3,4}
	4083	15	Rt M ³ frag
	5335	10	M ³
	5359	102	Rt M ^{1,2}
Horizon indet.	336	104	P _{3,4}

TABLE 5.6.
Hipparrison sp. B upper cheek teeth measurements (mm)

	KNM-ER No., area and zone	oc ap	oc tr	ptc	ht	plic
<i>P_{3,4}</i>	3988 (102 M.a?)	23	22	7	66	—
<i>M¹⁻²</i>	1231 (8A M.a)	23	(19)	8·5	73	—
	2073 (131 M.a)	23	21	10	70	12
	2263 (104 M.a)	22	21	11·5	69	(11)
	5359 (102 M.a)	20·5	20	7·3	55	(13)
<i>M³</i>	3985 (129 N.s)	19	16	8	35	—
	1263 (10 M.a)	20*	18*	8*	58	—
	5335 (10 M.a)	20*	17*	8*	52	—
	4083 (15 M.a)	18	15	7	46	—

FAMILY EQUIDAE

TABLE 5.7.
Hipparrison sp. B lower cheek teeth measurements
 (mm)

	KNM-ER No., area and zone	oc ap	oc tr	ect	ht
P ₂	4054 (101 M.a)	27	10	-	-
P ₃₋₄	1268 (130 N.s)	22.5	13	7	40
	4096 (130 N.s)	24	13	7.5	-
	4054 (101 M.a)	22.5	12.5	6.5	41
	2667 (8B M.a)	22	15	7.2	23
	336 (KF IIB)	22.2	13.9	-	21

TABLE 5.8.
Hipparrison hasumense (KNM-ER 2789 and AL 155-6)
 and *Hipparrison* cf. *ethiopicum* (others) astragali
 measurements (mm)

KNM-ER No., area and zone	length	max tr	art dist tr	art dist ap
4095 (116 B)	58	-	38	30
2789 (117 C)	65	61	47	35
1295 (103 M.a)	55	48	41	28
2047 (123 M.a)	60	54	45	32
5355 (103 M.a)	48	45	41	-
5356 (104 M.a)	57	49.5	41	30
2690 (8 M.c)	(55)	(50)	42.5	(30)
AL 155-6 (DDM)	(66.5)	(64)	(50)	36

DDM = Denen Dora Member of the Hadar Formation.

TABLE 5.9. *Hipparrison* cf. *ethiopicum* postcranial measurements (mm)

	KNM-ER No., area and zone	diap tr	diap ap	dist sup tr	dist art tr	dist art ap
Metatarsal III	1235 (8A M.a)	27	(24)	37.5	35	30.5
	1345 (6A M.a)	(30)	(28)	40.5	37	29
Tibia	1238 (6A M.a)	38	27.5		61*	41*

* Tibia measurements are maximum not articular.

Hipparrison sp. indet.

KNM-ER No.	Area	Specimen
Zone B	4077	129 P frag
<i>Metridiochoerus</i> <i>andrewsi</i> zone	3987	102 upper cheek tooth frag
	3993	103 P ₂ frag

FAMILY EQUIDAE

Equus koobiforensis

KNM-ER		
No.	Area	Specimen
<i>Notochoerus scotti</i> zone		
326	105	Rt mandible (P_2-M_3) and Lt mandible frag (P_2-M_2)
337	105	Rt $M_{1/2}$
1129	129	$P^{3/4}$
1256	105	Rt M^3
1265	130	Rt $P^{3/4}$
1266	130	Lt $M^{1/2}$
1271	105	Rt $M^{1/2}$
1272	105	Rt M^3
1484	130	cranium (Lt I^2-M^3 , Rt P^2-M^3)
1518	105	Lt mandible (P_2-M_3) and Rt $M_{1/2}$
2224	131	$Lt P^{3/4}$
2687	105	$M^{1/2}$
2716	129	$Lt P^{3/4}$
2740	14	Rt $M^{1/2}$
2741	14	$P^{3/4}$
3986	129	Rt $P^{3/4}$
4011	14	$Lt P^{3/4}$
4014	14	$Lt M^{1/2}$
4015	100	$Lt P^{3/4}$
4019	14	$Lt M_3$
4020	102	$Lt M^{1/2}$
4026	129	Rt $M_{1/2}$
4027	129	Rt $P^{3/4}$
4028	116	$Rt P_2$
4034	130	$M^{1/2}$
4036	129	Rt $M_{1/2}$
4037	129	Rt P_{2-3}
4043	129	$Lt P^{3/4}$
4044	129	Rt $P^{3/4}$
4046	100	Rt P_4 , Rt M_1
4051	115	Rt mandible frag (P_2-M_2)
4520	104	cranium (Lt and Rt M^{1-3})
5360	130	Rt mandible frag (P_2-M_3)
5361	100	Lt and Rt mandibles (I_1-M_3)
		cranial frags (P^{2-4} , M^3)
5519	102	maxilla frags (P^{2-4} , M^3)
<i>Metridiochoerus andrewsi</i> zone		
1239	104	premaxilla (I^1-C)
1242	102	Rt M^3
1243	102	$P^{3/4}$
1249	104	Rt M_3
1250	104	Rt M^3
1255	105	Lt M^2
1260	6A	Rt $P^{3/4}$
1269	105	Lt and Rt M_1
1582	104	Rt mandible and symphysis (Lt I_{1-3} , Rt I_1-M_3)

Equus koobiforensis cont.

KNM-ER		
No.	Area	Specimen
2061	104	M_3
2248	105	$Lt P^{3/4}$
2613	7	Rt M^3
2618	105	Rt M^3
2670	129	$Lt M^{1/2}$
2691	12A	Lt maxilla frags (P^2-M^3)
3992	101	$Lt M_{1/2}$
4006	103	Rt $M_{1/2}$
4025	105	$Lt P^{3/4}$
Guomde Formation		
333	105	Lt mandible frag (P_2-M_2)
Galana Boi Beds		
2931	117	$M_{1/2}$
Horizon indet.		
320	S. of Koobi Fora Ridge	Lt mandible frag (P_{3-4})
321	S. of Koobi Fora Ridge	Rt P_{3-4}
322	S. of Koobi Fora Ridge	Rt P_{3-4}
672	103	$Lt P^2$
674	103?	M^3
676	102	$Lt M^{1/2}$
679	102	$Rt P^{3/4}$
680	KF IIB	$Lt P_{2-4}$
681	KF IIB	$Lt P_{3-4}$
690	KF III	Lt mandible frag (M_{1-2})
3986	129	Rt P_{3-4}

Equus cf. koobiforensis

KNM-ER		
No.	Area	Specimen
<i>Notochoerus scotti</i> zone		
1276	105	associated limb bones (see pp. 187-188)
4052	100	Rt 3rd metatarsal
5358	100	Lt 3rd metatarsal
<i>Metridiochoerus andrewsi</i> zone		
1275	105	associated limb bones (see pp. 187-188)
2054	123	Rt distal radius
2625	7	Rt astragalus
3998	102	prox. and dist. Rt radius
Horizon indet.		
2317	?	astragalus

TABLE 5.10. *Equus koobiforensis* cranial measurements (mm)

	KNM-ER 1484 (130 N.s) <i>E. koobiforensis</i>	NIH 002* <i>E. sanmeniensis</i>	QSV 226† <i>E. stenonis</i> <i>vireti</i>	SEN 336‡ <i>E. stenonis</i> <i>senezensis</i>	<i>E. grevyi</i> (mean of c.50 specimens)
1	577	580	550	535	531·5
2	325	308	300	297	272·5
3	—	(152)	—	135	133
4	—	(116)	—	110	130·5
5	150	158	145	140	140·5
6	107	125	118	97	111·5
7	110	103	100	104	95·5
7 bis	91·5	90·5	84	83	78·5
8	202	192	186	187	173·5
9	—	—	—	—	83·5
10	53	—	47	50	48·5
10 bis	44	—	37	42·5	40
11	178	156	166	166	157
12	426	420	400	400	394
13	225	—	226	236	212
14	213	—	216	229	210
15	111	—	104	108	106
16	—	—	—	69	85
17	(64)	64·4	69	71	58
17 bis	(46)	—	50	44	40
18	—	—	—	600	597·5
19	13	16	14·5	18	14
20	—	—	—	—	17
21	77	69	61·5	67	63·5
22	61	56·5	57	60	60
23	472	480	445	438	420·5
24	—	(226)	—	232	213·5
25	—	130	—	—	106·5
26	140	143	126	128	138
27	140	—	124	144	147·5
28	98	—	96	110	108
29	81	97	92	93	80·5
30	36	40	42	39	35·5

* Collections of the Institut de Paléontologie, Paris.

† Collections of the Musée d'Histoire Naturelle, Lyon.

‡ Collections of the Naturhistorisches Museum, Basel.

TABLE 5.10. cont.

Methods of measurement from Eisenmann and De Giuli 1974; Eisenmann and Turlot 1978; Eisenmann in press c.

1	basilar length	16	maximum width of occipital crest
2	palatal length	17	muzzle width
3	distance from palate to vomer	17 bis	minimum muzzle width
4	distance from vomer to basion	18	vertex length
5	muzzle length	19	infraorbital height
6	length of diastema	20	height of external auditory meatus
7	length of premolars (P^2-4)	21	anteroposterior diameter of orbit
7 bis	length of molars	22	vertical diameter of orbit
8	length of upper cheek teeth row	23	anterior ocular line
9	choanal length	24	posterior ocular line
10	choanal maximum width	25	height of face in front of P^2
10 bis	choanal width between pterygoid processes	26	height of face between P^4 and M^1
11	width maxilla at facial crests	27	height of face behind M^3
12	basilar length minus muzzle length	28	height of cranium behind orbits
13	frontal width	29	width of occipital condyles
14	bizygomatic width	30	width of foramen magnum
15	maximum width cranial vault		

TABLE 5.11. *Equus koobiforensis* upper cheek teeth series measurements (mm)

KNM-ER No., area and zone		P^2	P^3	P^4	M^1	M^2	M^3
1484 (130 N.s)	oc ap	44	32.5	32	30.5	30	30
	ptc	8	11.5	11	11.6	12.6	12.7
	oc tr	29.5	29	28.5	28	26	(23)
	PI	18.2	35.4	34.4	38	42	42.3
5361B (100 N.s)	oc ap	40	32	(28)	—	—	29
	ptc	7	9.3	10	—	—	11
	oc tr	29	31	30	—	—	26
	PI	17.5	29.1	(35.7)	—	—	37.9
2691 (12A M.a)	oc ap	37	30.5	30	26.5	26.5	29
	ptc	6.5	8	10	9.5	10	13
	oc tr	27	30	30	28	27	24
	PI	17.5	26.2	33.3	35.8	37.7	44.8

FAMILY EQUIDAE

TABLE 5.12.
Equus koobiforensis isolated upper cheek teeth
 measurements (mm)

	KNM-ER No.	oc ap	ptc	oc tr	PI
P ²	672 (103 KF III)	40·5	8·6	25·8	21·2
P ³⁻⁴	1265 (130 N.s)	30	11	—	36·7
	2224 (131 N.s)	31	10·5	—	33·9
	4043 (129 N.s)	33	11·5	29	34·8
	4044 (129 N.s)	(35)	—	33	—
	5519 (102 N.s)	31	9	30·5	29
	1260 (6A M.a)	32	9	28	28·1
	4025 (105 M.a)	30	10	30	33·3
	679 (102?)	30·5	8·8	28·3	28·8
M ¹⁻²	1266 (130 N.s)	30	13·5	27	45
	1271 (105 N.s)	27·5	10	29	36·4
	2687 (105 N.s)	30	14·5	28	48·3
	2740 (14 N.s)	29·5	14	27·5	47·4
	4014 (14 N.s)	26·5	11	28	41·5
	4020 (102 N.s)	30	14·5	26	48·3
	4034 (130 N.s)	27	10·2	28·5	37·8
	1255 (105 M.a)	27·5	12	27	43·6
	2670 (129 M.a?)	32	12	27	37·5
	676 (102?)	28·5	11	26·5	38·6
M ³	1256 (105 N.s)	(27·5)	13	24	(47·3)
	1272 (105 N.s)	29	13	24	44·8
	4520 (104 N.s)	(33)	—	(25)	—
	5519 (102 N.s)	29	12	25	41·4
	1242 (102 M.a)	29	13	24·5	44·8
	1250 (104 M.a)	28·5	13·5	25	47·4
	2613 (7 M.a)	27·5	15·5	25	56·4
	2618 (105 M.a)	29	10	24	34·5
	674A (103 KF III)	28·2	11	24	39

M³ measurements include cement cover and were taken at a height of approximately 30 mm above the roots.

TABLE 5.13. *Equus koobiforensis* lower cheek teeth series measurements (mm)

KNM-ER No., area and zone		P ₂	P ₃	P ₄	M ₁	M ₂	M ₃
1518 (105 N.s)	oc ap	31	28·5	29	25·5	26·5	36·5
	oc tr	14	17	16·5	15·5	15	14
4051 (115 N.s)	oc ap	36	34	30	27·5	29	(36)
	oc tr	17	17·5	(17)	14·5	15	(15)
5360 (130 N.s)	oc ap	35·5	32	30	28	28	35
	oc tr	16	17	17·5	15	14·5	—
5361A (100 N.s)	oc ap	32	30	29	27	27	32
	oc tr	16	17	16·5	14	13·5	13
1582 (104 M.a)	oc ap	36	34	33	28	28	33
	oc tr	15	18	18	16·5	15	14
326-333 (KF IIA)	oc ap	35	31·1	30·3	26·3	28·5	29·3
	oc tr	16·4	16	16·3	14	13	—

FAMILY EQUIDAE

TABLE 5.14.
Equus koobiforensis isolated lower cheek teeth
 measurements (mm)

	KNM-ER No., area and zone	oc ap	oc tr
P_2	4028 (116 N.s)	37.7	16.2
	4037 (129 N.s)	(37)	—
P_{3-4}	2716 (129 N.s)	32	15
	2741 (14 N.s)	28	16.5
	3986 (129 N.s)	31.5	17.5
	4011 (14 N.s)	30	16
	4015 (100 N.s)	33	17
	4027 (129 N.s)	32	15.5
	4037 (129 N.s)	33	17
	1243 (102 M.a)	28	17
	2248 (104 M.a)	28	17
	4046 (100 M.a)	30	16
	680 (KF IIB)	30.2	16
	681 (KF IIB)	29.5	17
	776E (KF III)	29.6	16.5
	320 (S. of Koobi Fora Ridge)	30.2	15.2
	321 (S. of Koobi Fora Ridge)	30.2	16.2
	322 (S. of Koobi Fora Ridge)	31.2	16.2
M_{1-2}	337 (105 N.s)	30.5	12
	4026 (129 N.s)	29	12
	4036 (129 N.s)	28.5	14
	1269 (105 M.a)	30	13
	3992 (101 M.a)	25	14.5
	4006 (103 M.a)	26	14
	690 (KF III)	29.2	15.2
	690 (KF III)	26.2	14.7
	2931 (117 GB)	28	13.5
M_3	4019 (14 N.s)	(32)	14
	1249 (104 M.a)	32	12.5
	2061 (104 M.a)	31	13

Equus cf. tabeti

	KNM-ER No.	Area	Specimen
<i>Metridiochoerus andrewsi</i> zone	1211	1	partial cranium (Lt P^3-M^3 , Rt P^2-M^3)
	1237	6A	prox, anterior 1st phalanx
	5565	130	Lt P^4
	5566	130	Lt M^1
	5567	130	Lt and Rt I^{1-3}
<i>Metridiochoerus compactus</i> zone	2067	103	3rd metacarpal (pathological?)
	2069	103	3rd metacarpal frags, anterior and posterior 1st phalanges
Horizon indet.	325	Karari Ridge	Lt and Rt maxilla and Lt and Rt mandible frags

Equus sp. indet.

	KNM-ER No.	Area	Specimen
Zone C	4002	102	$M_{1/2}$
<i>Notochoerus scotti</i> zone	1254	105	Lt $M^{1/2}$
	1258	105	Rt $P^{3/4}$
	1267	130	Lt $M^{1/2}$
	1270	105	Rt M^3
	1273	105	Lt P^4
	2052	104	upper cheek tooth
	2059	100	M_2
	2655	105	Rt $P^{3/4}$
	2681	105	Rt $P^{3/4}$
	3855	102	lower cheek tooth frag
	4012	14	Rt $M^{1/2}$
	4018	102	I^1
	4021	105	$M^{1/2}$
	4029	129	$M^{1/2}$
	4032	130	upper dM or dP frag
	4040	129	Lt M_3
	4046	100	Rt M_{1-2}
	5669	105	$P^{3/4}$
	5670	105	$M^{1/2}$

(continued overleaf)

FAMILY EQUIDAE

Equus sp. indet. cont.

KNM-ER		
No.	Area	Specimen
Metridiochoerus andrewsi zone		
661	103	astragalus and calcaneum
685	103	astagalus, calcaneum, prox. metapodial, lateral metapodial
901	8	cranium (Lt M ¹⁻³), Rt M ³ and isolated upper teeth
1222	1	Rt mandible frag (P ₃₋₄)
1223	1	Lt P ₄ , Lt M ₃
1224	6	Lt P ₂
1225	8	Lt P ^{3/4} , Rt M frag
1226	8	Lt P ³⁻⁴ , Lt M ³
1229	8A	Rt M ^{1/2}
1241	104	Rt maxilla frag (P ^{3-M¹}) and Lt maxilla frag (P ^{4-M²})
1245	104	Lt dP ₂ , Rt M ₃
1246	104	Lt P ₂
1251	104	Rt P ¹ , Rt M ¹
1252	104	Lt P _{3/4}
1253	102	Rt P _{3/4}
1257	105	Lt M ¹
1259	6A	Lt P ^{3-M¹} , Rt P ³
1261	10	Lt M ^{1/2}
1262	8B	M ^{1/2}
1274	105	Lt 3rd metacarpal
1277	103	Rt tibia
1280	103	Rt P ^{3/4}
1281	103	Rt M ^{1/2} , Lt M ³
1282	103	M ^{1/2}
1284	102	Lt P _{3/4}
1286	103	Rt maxilla frag (M ³)
1287	104	P ₂
1288	103	Lt M _{1/2}
1289	102	M ₃
1290	103	Lt astragalus
1291	103	dist. 3rd metatarsal, cuneiform
1292	103	dist. 3rd metatarsal
1293	103	Rt M ^{1/2}
1296	103	Lt astragalus
1297	103	prox. and dist. 3rd metacarpal
1349	8	dist. Rt radius
1385	6A	astragalus
1717	103	prox. 3rd metacarpal
1980	121	M ^{1/2}
1982	10	M ^{1/2}
2048	104	astragalus
2049	104	astragalus
2050	121	3rd metacarpal
2055	104	dist. radius
2057	104	prox. and dist. 3rd metatarsal
2062	104	P ²
2063	102	Rt P ^{3/4} , Lt M ^{1/2} , Lt M ³
2064	103	Rt P ^{3/4}
2065	103	Lt M ^{1/2}
2068	121	Rt P ²⁻³ , Lt P ² , Lt P ⁴ , Lt M ¹ , Lt M ³

Equus sp. indet. cont.

KNM-ER		
No.	Area	Specimen
Metridiochoerus compactus zone		
1228	3	Lt M ¹⁻²
2630	8	Lt M ¹⁻² , Rt and Lt M ₃
2637	6A	Rt P ₂
2640	6A	Rt mandible frag (P _{3-M₂})
2654	6A	Rt M ³
2676	6A	Rt P ₃₋₄
2695	6	Lt M ³
Horizon indet.		
318	S. of Karari Ridge	Rt mandible frag (M ₂₋₃)
319	S. of Karari Ridge	Rt mandible frag (P ₃₋₄)
334	103	P ²⁻⁴ , M ²⁻³
335	1	P ₄ , M ₃
665	KF III	P ₂
647	KF III	M ³
678	130	Lt P ^{3/4}
684	KF III	P ³⁻⁴ , M ^{1/2} , M ³
689	103	Rt mandible frag (P ₂₋₄)
1288	103	Lt M _{1/2}
5887	KF III	M ³

FAMILY EQUIDAE

TABLE 5.15. Koobi Fora *Equus* cf. *tabei* and *E.* sp. associated upper cheek teeth measurements (mm)

KNM-ER No., area and zone		P ²	P ³	P ⁴	M ¹	M ²	M ^{3*}
325 (Karari Ridge) <i>E. cf. tabeti</i>	oc ap			28	24·5	24·3	25·5
	ptc			9·7	7·8	9	11
	oc tr			29	26·2	25·7	22·2
	PI			34·6	31·8	37	43·1
1211 (1 M.a) <i>E. cf. tabeti</i>	oc ap	36	28	27	26	26	—
	ptc	8	9·5	10	9	10·5	—
	oc tr	26	26	23	25·5	23	22
	PI	22·2	33·9	37	34·6	39·6	—
334 (KF III) <i>E. sp. indet.</i>	oc ap	38	28	26·2		24·6	25
	ptc	7·5	8·7	10·9		11	12
	oc tr	(25·5)	27·8	26·9		25	21
	PI	19·7	31·1	41·6		44·7	48
901 (8B M.a) <i>E. sp. indet.</i>	oc ap				24·5	25	24
	ptc				11	10·5	10·5
	oc tr				24·5	24	20·5
	PI				44·9	42	43·7
1241 (104 M.a) <i>E. sp. indet.</i>	oc ap		29·5	27	24	25	
	ptc		10	10·5	10	11	
	oc tr		27·5	28·5	25·5	25·5	
	PI		33·9	38·9	41·7	44	
1259 (6A M.a) <i>E. sp. indet.</i>	oc ap		28	26	25		
	ptc		9	9·5	11		
	oc tr		28	26·5	25		
	PI		32·1	36·5	44		
2068 (121 M.a) <i>E. sp. indet.</i>	oc ap	—	27	26		24	24
	ptc	6	10	10		10	11·5
	oc tr	23·5	25	26		22·5	21
	PI	—	37	38·5		41·7	47·9
4056 (103 M.a) <i>E. sp. indet.</i>	oc ap	—	31				26
	ptc	7	9				10·5
	oc tr	28	—				21·5
	PI	—	29				40·4

* M³ measurements include cement cover and were taken at a height of approximately 30 mm above the roots.

TABLE 5.16.

Koobi Fora *Equus* cf. *tabeti* and *E.* sp. isolated upper premolars measurements (mm)

	KNM-ER No., area and zone	oc ap	ptc	oc tr	PI
P ²	2062 (104 M.a)	40	9	26	22·5
	2685 (15 M.a)	37	6·5	24	17·5
P ³⁻⁴	1258 (105 N.s)	30	11·5	—	38·3
	1273 (105 N.s)	28	12	27	42·8
	2681 (105 N.s)	27·5	9	28·5	32·7
	5669 (105 N.s)	30	—	27·5	—
	1225 (8 M.a)	27	10	25	37
	1226 (8 M.a)	27	12·5	25	46·3
	1251 (104B M.a.)	29	13	27	44·8
	1280 (103 M.a)	30	12·2	28	40·7
	2063 (102 M.a)	28·5	9	26	31·6
	2064 (103 M.a)	30	8	27	26·7
	2688 (8B M.a?)	28	8	27	28·6
	4000 (103 M.a)	30	12	26	40
	4033 (102 M.a)	30	10	27	33·3
	4065 (8A M.a)	25	9·5	25·3	38
	**5565 (130 M.a.)	25	8	26	40
M ¹⁻²	678 (130 KF II A)	30·6	9	27·5	29·4
	684A (105 KF III)	29·4	14	26·3	47·6
	684D (105 KF III)	29·5	13	26·5	44·1

** *Equus* cf. *tabeti*. (All others *Equus* sp. indet.).

TABLE 5.17.

Koobi Fora *Equus* cf. *tabeti* and *E.* sp. isolated upper molars measurements (mm)

	KNM-ER No., area and zone	oc ap	ptc	oc tr	PI
M ¹⁻²	1254 (105 N.s)	26	10·5	25	40·4
	1267 (130 N.s)	25·5	11	—	43·1
	4012 (14 N.s)	26	10·3	25·5	39·6
	4021 (105 N.s)	27	10	25	37
	4029 (129 N.s)	24	10	25	41·2
	5670 (105 N.s)	24	—	—	—
	901 (8A M.a)	26	10	25	38·5
	1229 (8A M.a)	26	8·5	25	32·7
	1251 (104B M.a)	27	14·5	25·5	53·7
	1257 (105 M.a)	26	11	24	42·3
	1261 (10 M.a)	25	10	24	40
	1262 (8B M.a)	24	11	25	45·8
	1281 (103 M.a)	27	10	27	37
	1282 (103 M.a)	23·5	7·5	24	31·9
	1293 (103 M.a)	25	12·2	26	48·8
M ³	1980 (121 M.a)	24	9	23	37·5
	1982 (10 M.a)	23	11·5	23	50
	2063 (102 M.a)	27	10·2	24	37·8
	2065 (103 M.a)	25·2	10·2	26	40·5
	3996 (12 M.a)	24·5	10·5	23	42·8
	4030 (101 M.a)	25·5	13·5	23·5	52·9
	4050 (102 M.a)	28·5	9·5	25	37·2
	4078 (102 M.a)	26·5	9·5	24	35·8
	5189 (104 M.a?)	24·5	10	24·8	40·8
	5668 (104 M.a)	25	9	—	36
	1228 (3 M.c)	24	10·5	24	43·7
	2630 (8 M.c)	24	10	25	41·7
	684B (103 KF III)	26·4	11·7	25·9	44·3
	**5566 (130 M.a)	22	8	25	36·4

** *Equus* cf. *tabeti*. (All others *Equus* sp. indet.).

TABLE 5.18.
Koobi Fora *Equus* cf. *tabeti* and *E.* sp. lower cheek
teeth measurements (mm)

	KNM-ER No., area and zone	oc ap	oc tr
<i>P</i> ₂	1224 (6 M.a)	32	15
	1246 (104 M.a)	33	15·3
	5886 (105 M.a)	33·5	14·5
	1287 (104 M.a)	(32)	14
	4007 (102 M.a)	34	15·5
	4010 (102 M.a)	34	16
	2637 (6A M.c)	32·5	15
	665 (103 KF III)	33·9	14·5
	689 (103 KF III)	30·2	13·2
<i>P</i> ₃₋₄	2655 (105 N.s)	29	15
	1222 (1 M.a)	27	15
	1223B (1 M.a)	27·5	15·5
	1252 (104B M.a)	27	(14·5)
	1253 (102 M.a)	28	(15)
	1284 (102 M.a)	27	13
	2148 (104 M.a)	26	15
	4007 (102 M.a)	29	17
	4023 (105 M.a)	27	15·5
	2640 (6A M.c)	29	14·5
	2640 (6A M.c)	25	14·5
	2676 (6A M.c)	27	14
	319 (2 S. of Koobi Fora Ridge)	(28·5)	—
<i>M</i> ₁₋₂	319 (2 S. of Koobi Fora Ridge)	27	—
	689 (103 KF II)	26·5	14·8
	2059 (100 N.s)	25·5	12
	1288 (103 M.a?)	25	12
	3994 (102 M.a)	26	12
	4009 (102 M.a)	25	12·5
	4022 (105 M.a)	26	13
	4046 (100 M.a)	24	13
	2640 (6A M.c)	23	14
	2640 (6A M.c)	22·5	13
<i>M</i> ₃	2676 (6A M.c)	24	14·5
	4040 (129 N.s)	31	12
	1223A (1 M.a)	28·5	13
	2630 (8 M.c)	29	12
	318 (4 S. of Koobi Fora Ridge)	32	14
* 325 (4 Karari Ridge)		30·3	12·9

* *Equus* cf. *tabeti*. (All others *Equus* sp. indet.).

TABLE 5.19. Koobi Fora *Equus* species third metacarpal measurements (mm)

* Diaphysis minimum width.

† Diaphysis minimum anteroposterior diameter.

TABLE 5.20. Koobi Fora *Equus* species third metatarsal measurements (mm)

KNM-ER No., area and zone	length	diap tr	diap ap	prox max tr	prox max ap	ecto- cuneiform facet tr	cuboid facet ap	dist sup tr	dist art tr	dist art ap	min ap int condyle	max ap int condyle
5358 (100 N.s) <i>E. cf. koobijorensis</i>	287.5	33	31	52	41	45	11	47.5	45.5	37	29	30.5
4052 (100 N.s) <i>E. cf. koobijorensis</i>	—	30	—	49.5	40	—	—	47.5	44	35	29	30.5
1275G (105 M.a) <i>E. cf. koobijorensis</i>	266	31.1	29	49	39.5	44	11.5	44.5	44.2	36.7	27.5	30
1291A (103 M.a) <i>E. sp indet.</i>	—	30	29	—	—	—	—	44	44	33.5	25.5	28
1292 (103 M.a) <i>E. sp indet.</i>	—	—	—	—	—	—	—	44	42.5	34.5	25.5	28.5
2057 (104 M.a) <i>E. sp indet.</i>	—	33.5	29	46	41.5	42	9	44.5	43.5	33.5	25.5	(28.5)
2238 (130 N.s) <i>E. sp indet.</i>	—	—	—	45.5	37.5	40.5	9	—	—	—	—	—
2301B (131 N.s) <i>E. sp indet.</i>	253.5	30	28	(42)	(36)	—	—	44	42.5	—	26	29

Equus cf. grevyi

		KNM-ER No.	Area	Specimen
<i>Metridiochoerus compactus</i> zone	1227	1	Rt P ³⁻⁴	
	1457	103	maxilla (Lt and Rt P ^{3-M³})	
	2056	118	Rt mandible frag (P ₂₋₄)	
	2066	103	Lt M ¹⁻²	
	2652	6A	Lt P ³⁻⁴ , Lt P ₃₋₄	
	2672	6A	M ¹⁻²	
	2680	3	Rt P ³⁻⁴	
	2684	6A	Rt P ³⁻⁴	
Guomde Formation	4066	6A	M ₁₋₂	
Galana Boi Beds	4055	117	associated upper and lower teeth (Rt P ² , Rt M ¹⁻³ , Lt P ⁴ , Lt M ¹⁻³ , Rt P ₃₋₄ , M ₁₋₂)	
Horizon indet.	677		P ³⁻⁴	
	2302	102	radius	

TABLE 5.21. *Equus cf. grevyi* upper cheek teeth measurements (mm)

	KNM-ER No., area and zone	oc ap	ptc	oc tr	PI
P ²	1457 (103 M.c.)	40	6.5	29	16.2
	4055 (117 GB)	(40)	8	29	(20)
	1457 (103 M.c.)	31	10.5	30	33.9
	1457 (103 M.c.)	30	11	29	36.7
	4055 (117 GB)	30	13	31	43.3
	1227 (1 M.c.)	30.5	11	—	36.1
	2652 (6A M.c.)	29	11	28	37.9
	2680 (3 M.c.)	30	10	30	33.3
P ³⁻⁴	2684 (6A M.c.)	30.5	11	(26)	36.1
	677 (KF IIIB)	29.8	13	29.5	43.6
M ¹	1457 (103 M.c.)	27	11	27.5	40.7
	4055 (117 GB)	28	13	29	46.4
M ²	1457 (103 M.c.)	28	13	27	46.4
	4055 (117 GB)	27.5	13.5	28	49.1
M ¹⁻²	2066 (103 M.c.)	27	12	28	44.4
	2672 (6A M.c.)	28	12.5	25	44.6

TABLE 5.22.

Equus cf. grevyi lower cheek teeth measurements (mm)

	KNM-ER No., area and zone	oc ap	oc tr
P ₂	2056 (108 M.c.)	35.5	16
P ₃	2056 (108 M.c.)	30	18
	4055 (117 GB)	(34)	19
P ₄	2056 (108 M.c.)	29.5	18
M ₁	4055 (117 GB)	29	15.5
M ₁₋₂	4066 (6A GF)	(28)	12.5

Equus cf. burchelli

	KNM-ER No.	Area	Specimen
<i>Metridiochoerus compactus</i> zone	2678	6A	posterior 1st phalanx
	5700	6A	posterior 1st phalanx

Equidae gen. and sp. indet.

	KNM-ER No.	Area	Specimen
Zone B/C	4001	130	upper cheek tooth frag
	4057	116	dP ₂₋₄
<i>Notochoerus scotti</i> zone	4004	102	dP ²
	4013	105	M ³
	4042	105	dist. frag radius
<i>Metridiochoerus andrewesi</i> zone	2300	102	prox. frag femur
<i>Metridiochoerus compactus</i> zone	2677 2683	6A 6A	dP ² or dM
Horizon indet.	930	102	skull frag

REFERENCES

- AGUIRRE, E. and ALBERDI, M. T. (1974). *Hipparrison* remains from the Northern part of the Rift Valley (Kenya). *Koninkl. Nederl. Akad. van Wetenschappen Sér. B*, **77**, 146–157.
- ALBERDI, M. T. (1974). El genero *Hipparrison* en Espana. Nuevas formas de Castilla y Andalucia, revision e historia evolutiva. *Trab. Neogeno-Cuat.* 1–146.
- ARAMBOURG, C. (1947). Contribution à l'étude géologique et paléontologique du bassin du lac Rodolphe et de la basse vallée de l'Omo. Deuxième partie: Paléontologie (Mission scientifique de l'Omo). *Edit. Museum I*, 231–562.
- (1956). Sur des restes d'*Hipparrison sitifense* Pomel, des calcaires lacustres de Mascara (Oran). *Bull. Soc. géol. Fr.* **6**, 817–27.
- (1959). Vertébrés continentaux du Miocène supérieur de l'Afrique du Nord. *Publ. Serv. Carte géol. Algérie*, n.s. *Paléont.* **4**, 1–161.
- (1970). Les vertébrés du Pléistocène de l'Afrique du Nord: Vol. I. *Archs Mus. natn. Hist. nat. Paris 7e sér.* **10**, 1–128.
- ARONSON, J. L., SCHMITT, T. J., WALTER, R. C., TAIEB, M., TIERCELIN, J. J., JOHANSON, D. C., NAESER, C. W., and NAIRN, A. E. M. (1977). New geochronologic and palaeomagnetic data for the hominid-bearing Hadar formation of Ethiopia. *Nature, Lond.* **267**, 323–7.
- BISHOP, W. W., CHAPMAN, G. R., HILL, A., and MILLER, J. A. (1971). Succession of Cainozoic vertebrate assemblages from the northern Kenya Rift Valley. *Nature, Lond.* **233**, 389–94.
- BONE, E. L. and SINGER, R. (1965). *Hipparrison* from Langebaanweg, Cape Province, and a revision of the genus in Africa. *Ann. S. Afr. Mus.* **48**, 273–397.
- BROOM, R. (1909). On evidence of a large Horse recently extinct in South Africa. *Ann. S. Afr. Mus.* **7**, 281–2.
- (1913). Note on *Equus capensis* Broom. *Bull. Am. Mus. nat. Hist.* **32**, 437.
- CABRERA, A. (1936). Subspecific and individual variation in the Burchell Zebras. *J. Mamm.* **17**, 89–112.
- CAMP, C. L. and SMITH, N. (1942). Phylogeny and function of the digital ligaments of the horse. *Mem. Univ. Calif.* **13**, 69–124.
- CHURCHILL, C. S. and RICHARDSON, M. L. (1978). Equidae. In *Evolution of African mammals* (ed. V. J. Maglio and H. B. S. Cooke), pp. 379–422. Harvard University Press, Cambridge, Mass.
- COOKE, H. B. S. (1950). A critical revision of the Quaternary Perissodactyla of Southern Africa. *Ann. S. Afr. Mus.* **31**, 393–479.
- and CORYNDON, S. (1970). Pleistocene mammals from the Kaiso formation and other related deposits in Uganda. In *Fossil vertebrates of Africa* (ed. L. S. B. Leakey and R. J. G. Savage), Vol. II, pp. 107–224. Academic Press, London.
- COPPENS, Y. (1975). Evolution des Mammifères, de leurs fréquences et de leurs associations, au cours du Plio-Pléistocène dans la basse vallée de l'Omo en Ethiopie. *C. r. hebd. Séanc. Acad. Sci., Paris* **281**, 1571–4.
- DIETRICH, W. O. (1942). Ältestquartäre Säugetiere aus der südlichen Serengeti, Deutsch-Ostafrika. *Palaeontographica A* **94**, 43–133.
- EISENMANN, V. (1976a). Nouveaux crânes d'Hipparrison (Mammalia, Perissodactyla) plio-pléistocènes d'Afrique orientale (Ethiopie et Kenya): *Hipparrison* sp., *Hipparrison cf. ethiopicum* et *Hipparrison afarensis* nov. sp. *Géobios* **9**, 577–605.
- (1976b). Le protostylique: valeur systématique et signification phylétique chez les espèces actuelles et fossiles du genre *Equus* (Perissodactyla, Mammalia). *Z. Säugetierk.* **41**, 349–65.
- (1976c). A preliminary note on Equidae from the Koobi Fora formation, Kenya. In *Earliest man and environments in the Lake Rudolf Basin* (ed. Y. Coppens, F. C. Howell, G. L. Isaac, and R. E. Leakey), pp. 234–7. University of Chicago Press.
- (1977). Les Hipparions africains: valeur et signification de quelques caractères des jugales inférieures. *Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris 3e Sér. Sci. Terre* **60**, 69–87.
- (1979a). Les chevaux (*Equus sensu lato*) fossiles et actuels: étude craniologique et odontologique. Thèse Doctorat d'Etat, Sci. nat., Univ. P. et M. Curie, pp. 1–144. Paris.
- (1979b). Caractères évolutifs et phylogénie du genre *Equus* (Mammalia Perissodactyla). *C. r. hebd. Séanc. Acad. Sci., Paris* **288**, 497–500.
- (1979c). Le genre *Hipparrison* (Mammalia, Perissodactyla) et son intérêt biostratigraphique en Afrique. *Bull. Soc. géol. Fr. 7e Sér.* **21**, 277–81.
- (1979d). Etude des cornets des dents incisives inférieures des *Equus* (Mammalia, Perissodactyla) actuels et fossiles. *Palaeontogr. Ital.* **71**, 55–75.
- (1979e). Les métapodes d'*Equus sensu lato* (Mammalia, Perissodactyla). *Géobios* **12**, 863–86.
- (1980a). Caractères spécifiques et problèmes taxinomiques relatifs à certains Hipparions africains. *Actes du 8e Congr. panafricain de Préhistoire*, pp. 77–81.
- (1980b). Les chevaux (*Equus sensu lato*) fossiles et actuels: crânes et dents jugales supérieures. *Cah. Pal.*, Ed. CNRS, Paris, pp. 1–186.
- (1981). Etude des dents jugales inférieurs des *Equus* (Mammalia, Perrissodactyla) actuels et fossiles. *Paleovertebrata* **10**, 127–226.
- (in press). Les Equidés de l'Omo. *Travaux de Paléontologie de la Mission intern. de l'Omo (Ethiopie)*. CNRS, Paris.
- and BRUNET, J. (1973). Présence simultanée de cheval et d'hipparion dans le Villafranchien moyen de France à Roccanevra (Puy de Dôme); étude critique de cas semblables (Europe et Proche Orient). Intern. Coll. on: *The boundary between Neogene and Quaternary*. collection of Papers IV, pp. 104–22. Moscow.
- and DE GIULI, C. (1974). Caractères distinctifs entre vrais Zébres (*Equus zebra*) et Zébres de Chapman (*Equus burchelli antiquorum*) d'après l'étude de 60 têtes osseuses. *Mammalia* **38**, 509–43.
- and TURLOT, J. C. (1978). Sur la taxinomie du genre *Equus* (Equidés). *Cah. Analyse Données* **3**, 179–201.
- EWER, R. F. (1963). The contribution made by studies of the associated mammalian faunas. *S. Afr. J. Sci.* **59**, 340–6.
- FORSTEN, A. M. (1968). Revision of the Palearctic Hipparrison. *Acta zool. fenn.* **119**, 1–134.
- (1972). *Hipparrison primigenium* from Southern Tunisia. *Trav. Géol. Tun.* 5, Not. Serv. Géol. 35, Form. Beglia, fasc. 1, 7–28.
- (1978a). Hipparrison and possible Iberian–North African Neogene connections. *Ann. zool. fenn.* **15**, 294–7.
- (1978b). *Hipparrison primigenium* (v. Meyer, 1829), an early three-toed Horse. *Ann. zool. fenn.* **15**, 298–313.

- GABUNIA, L. K. (1959). Contribution à l'histoire des Hipparions (d'après le matériel du Néogène d'U.R.S.S.). *Ed. Acad. Sci. URSS Moscow* 1-570.
- GENTRY, A. W. and GENTRY, A. (1978). Fossil Bovidae (Mammalia) of Olduvai Gorge, Tanzania, Part II. *Bull. Br. Mus. (nat. Hist.), Geol. ser.* **30**, 1-83.
- GROMOVA, V. (1949a). Istorija loshadej (roda *Equus*) v Starom Svetem. Chast' 1. Obzor i opisanie form. *Trudy Paleont. Inst., Akad. Nauk SSSR* **17**, 1-373.
- (1949b). Istorija loshadej (roda *Equus*) v Starom Svetem. Chast' 2. Evoljutsija i klasifikatsija roda. *Trudy Paleont. Inst., Akad. Nauk SSSR* **17**, 1-162.
- (1952). Gippariony (Rod Hipparion) po materialam Taraklii, Pavlodara i drugim. *Trudy Paleont. Inst. Akad. Nauk SSSR* **36**, 1-475.
- GROVES, C. P. (1974). *Horses, asses and zebras in the wild*, pp. 1-192. David and Charles, London.
- and MAZAK, V. (1967). On some taxonomic problems of Asiatic wild asses, with the description of a new subspecies (*Perissodactyla*, *Equidae*). *Z. Säugetierk.* **32**, 321-55.
- GUÉRIN, C. (1979). Chalicotheriidae et Rhinocerotidae (Mammalia, Perissodactyla) du Miocène au Pléistocene de la Rift Valley (Afrique Orientale). Un exemple d'évolution: le squelette post-crânien des *Diceros* et *Ceratotherium* Plio-Pléistocènes. *Bull. Soc. géol. Fr.* **2**, 283-8.
- HARRIS, J. M. (1978). In *Koobi Fora research project. Vol. 1. The fossil hominids and an introduction to their context 1968-1974* (ed. M. G. Leakey and R. Leakey), pp. 1-191. Clarendon Press, Oxford.
- and WHITE, T. D. (1979). Evolution of the Plio-Pleistocene African Suidae. *Trans. Am. Phil. Soc., Philadelphia* **69**, 1-128.
- HAUGHTON, S. H. (1932). The fossil Equidae of South Africa. *Ann. S. Afr. Mus.* **28**, 407-27.
- HEINTZ, E. (1970). Les Cervidés villafranchiens de France et d'Espagne. *Mém. Mus. nat. Hist. nat. C* **22**, 303; Vol. 2, 319.
- HENDEY, Q. B. (1978). The age of the fossils from Baard's Quarry, Langebaanweg, South Africa. *Ann. S. Afr. Mus.* **75**, 1-24.
- HOFFSTETTER, R. (1952). Les Mammifères pléistocènes de la République de l'Equateur. *Mém. Soc. géol. Fr.* **31**, 1-391.
- HOOIJER, D. A. (1975). Miocene to Pleistocene Hipparions of Kenya, Tanzania and Ethiopia. *Zool. Verh.* **142**, 1-75.
- (1976). The late Pliocene Equidae of Langebaanweg, Cape Province, South Africa. *Zool. Verh.* **148**, 1-39.
- (1978). Rhinocerotidae. In: Maglio, V. J. and H. B. S. Cooke (eds) *Evolution of African Mammals*, 371-8; Harvard University Press, Cambridge.
- (1979). Hipparions of the Laetoli beds, Tanzania. *Zool. Med.* **54**, 15-33.
- and MAGLIO, V. J. (1973). The earliest Hipparion south of the Sahara, in the late Miocene of Kenya. *Koninkl. Nederl. Akad. van Wetenschappen Ser. B*, **76**, 311-15.
- (1974). Hipparions from the late Miocene and Pliocene of Northwestern Kenya. *Zool. Verh.* **134**, 1-32.
- HOPWOOD, A. T. (1937). Die fossilen Pferde von Oldoway. *Wiss. Ergeb. Oldoway Exped. 1913 NF* **4**, 111-36.
- JOLEAUD, L. (1933). Un nouveau genre d'Equidé quaternaire de l'Omo (Abyssinie): *Libyhipparion ethiopicum*. *Bull. Soc. géol. Fr.* **3**, 7-27.
- JOUBERT, E. (1972). Tooth development and age determination in the Hartmann Zebra *Equus zebra hartmannae*. *Madoqua Ser.* **1**, 5-16.
- LEAKEY, L. S. B. (1965). *Olduvai Gorge 1951-1961*, Vol. 1. A preliminary report of the geology and fauna, pp. 1-109. Cambridge University Press.
- LEAKEY, M. D. and HAY, R. L. (1979). Pliocene footprints in the Laetoli Beds at Laetoli, northern Tanzania. *Nature, Lond.* **278**, 317-23.
- MAGLIO, V. J. (1972). Vertebrate faunas and chronology of Hominid-bearing sediments East of Lake Rudolf, Kenya. *Nature, Lond.* **239**, 379-85.
- MEIN, P. (1975). Biozonation du Néogène méditerranéen à partir des Mammifères. Report on activity of RCMNS Working Groups, 78-81. Bratislava.
- POMEL, A. (1897). Homme, singe, carnassiers, équidés, suilliens, ovidés. Les Equidés. *Carte géol. Algérie*, Pal. Mon. 1-44.
- RAU, R. E. (1974). Revised list of the preserved material of the extinct Cape colony Quagga, *Equus quagga quagga* (Gmelin). *Ann. S. Afr. Mus.* **65**, 41-87.
- (1978). Additions to the revised list of preserved material of the extinct cape colony Quagga and notes on the relationship and distribution of southern plains zebras. *Ann. S. Afr. Mus.* **77**, 27-45.
- SIMPSON, G. G. (1941). Large Pleistocene Felines of North America. *Am. Mus. Novitates* 1-27.
- SONDAAR, P. (1962). Les Hipparion de l'Aragon méridional. *Estudios Geol. Inst. Invest. Lucas Mallado* **17**, 209-305.
- (1968). The osteology of the manus of fossil and recent Equidae with special reference to phylogeny and function. *Koninkl. Nederl. Akad. van Wetenschappen* **25**, 1-76.
- (1971). The Samos Hipparion. *Proc. Koninkl. Nederl. Akad. van Wetenschappen Ser. B, Phys. sci.* **74**, 417-41.
- (1974). The Hipparion of the Rhone Valley. *Géobios* **4**, 289-306.
- VAN HOEPEN, E. C. N. (1930). Fossile Pferde van Cornelis O.V.S. *Paleont. Navors. Nas. Mus.* **2**, 13-24.
- WHITE, T. D. and HARRIS, J. M. (1977). Suid evolution and correlation of African hominid localities. *Science, NY* **198**, 13-21.
- WILLOUGHBY, D. P. (1974). *The empire of Equus* (ed. Barnes), pp. 1-475. New York.
- ZHEGALLO, V. I. (1978). The Hipparions of Central Asia. *Trans. Joint Soviet-Mongolian Exped.* **7**, 1-152.
- ZUKOWSKY, L. (1964). Die systematik der Gattung *Diceros* Gray, 1821. *Zool. Garten (N.F.)* **30**, 1-178.